

Sporenvermessung

Dieter Lode 14.08.2014

Boletus luridus var. erythroteron (Rotfleischiger Hexenröhrling)

Fundstelle: MTB 6513/3/4/1, Hochspeyer, Mitteleck, am Rande der Hochstraße

Sporenfoto: IMG_0113 vom 14.08.2014

Quadrant	n	L(µm)	B(µm)	L/B
1	1	13,6	5,6	2,42
	2	13,1	4,7	2,80
	3	12,6	5,1	2,45
	4	14,7	6,1	2,42
	5	13,1	5,6	2,33
	6	13,1	5,4	2,43
	7	12,6	5,6	2,25
	8	14,5	5,6	2,58
	9	12,2	5,4	2,26
	10	11,7	5,1	2,27
	11	13,1	5,6	2,33
2	12	12,6	5,1	2,45
	13	13,1	5,1	2,55
	14	12,2	5,4	2,26
	15	12,4	5,1	2,41
	16	12,2	5,1	2,36
	17	13,6	5,1	2,64
	18	12,2	5,1	2,36
	19	12,2	5,1	2,36
	20	12,2	5,6	2,17
3	21	11,7	5,4	2,17
	22	13,6	5,6	2,42
	23	13,1	4,7	2,80
	24	11,7	5,1	2,27
	25	11,7	5,1	2,27
	26	13,6	6,1	2,23
	27	12,2	5,4	2,26
	28	12,4	4,9	2,52
	29	12,6	5,1	2,45
	30	12,9	4,7	2,75
	31	14,0	5,6	2,50
4	32	15,4	6,1	2,54
	33	14,0	5,6	2,50
	34	12,2	5,4	2,26
	35	12,2	5,1	2,36
	36	15,9	5,6	2,83
	37	12,2	5,6	2,17
	38	14,0	5,6	2,50
	39	13,1	5,6	2,33
Mittelwerte gesamt		13,0	5,4	2,42
Mittelwerte ohne Extreme		13,4	5,4	2,40

Sporengröße (µm) (11,7) 12,2 - 15,4 (15,9) X (4,7) 4,9 - 5,6 (6,1)
Sporen L/B (2,17) 2,23 - 2,75 (2,8)